

Fluxo para pacientes com suspeita de Febre Amarela – Baixada Santista e Vale do Paraíba

Definição de casos suspeitos de Febre Amarela:

Febre (referida ou medida) com duração de até 07 dias + 02 dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia, artralgia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tontura, dor abdominal, icterícia e/ou manifestações hemorrágicas.

Atenção às pessoas sem comprovante de vacinação ou que tenha recebido a primeira dose há menos de 30 dias.

Exames complementares obrigatórios:

Hemograma, TGO (AST), TGP (ALT), bilirrubinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, INR (TP)

Exames normais

Orientação sinais de alarme, hidratação e seguimento caso

Exames pouco alterados:
TGO/TGP < 500 U/L e INR < 1,3 e Plaquetas > 100.000/mm³ e U < 75 mg/dL e Cr < 1,2 mg/dL e Quadro clínico estável

Alta hospitalar com nova reavaliação em 12h. Orientar sobre os sinais de alarme

Exames:
TGO/TGP: 500 - 2.500 U/L e INR < 1,3 - 1,5 e Plaquetas > 90.000/mm³ e U < 75 mg/dL e Cr < 1,2 mg/dL e Quadro clínico estável

Solicitar vaga retaguarda local para internação-enfermaria

Evolução com sinais de gravidade

UTI

Alteração do nível de consciência / sonolência / convulsão e/ou TGO/TGP > 2.500 U/L e/ou INR > 1,5

Exames:

TGO/TGP > 2.500 U/L e INR > 1,5 e/ou Plaquetas < 90.000/mm³ e/ou Disfunção Renal

Se disponível dosar Fator V e amônia

Solicitar vaga de UTI no CROSS e manter paciente em sala crítica e monitorado até a transferência (IIER - UTI)

Se criança ou gestante: Solicitar vaga (via CROSS) no HC/FMUSP

Notificação imediata (Sinan) + coleta de sorologia ou PCR para febre amarela

Óbito de caso suspeito: encaminhar ao SVO