


ALERTA DA SÍFILIS CONGÊNITA

Carmen Silvia Bruniera Domingues

**Coordenação das Ações para Eliminação da TV do HIV e sífilis congênita
Programa Estadual IST/AIDS de São Paulo
CRT – DST/AIDS - CCD – SES - SP
14 de Julho de 2020**




Taxa de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes), taxa de detecção de sífilis em gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita (por mil nascidos vivos), segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)
 Nota: *Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

Percentual de casos de sífilis em gestantes com pré-natal, segundo trimestre gestacional de diagnóstico e ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

■ 1º trimestre ■ 2º trimestre ■ 3º trimestre ■ Ign/Branco

Distribuição percentual de sífilis em gestantes com realização de teste não treponêmico (VDRL) e teste treponêmico, durante o pré-natal, segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

**Não foram incluídas gestantes diagnosticadas e notificadas no parto: 1.372 gestantes em 2018.

■ Teste não treponêmico (VDRL) ■ Teste treponêmico

Distribuição percentual de sífilis em gestantes com tratamento prescrito com penicilina (ao menos uma dose) e prescrito conforme classificação clínica da doença, durante o pré-natal, segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

**Não foram incluídas gestantes diagnosticadas e notificadas no parto: 1.372 gestantes em 2018.

■ Prescrição de penicilina ■ Prescrição conforme classificação clínica


Taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por mil nascidos vivos (NV), segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.


Taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por mil nascidos vivos (NV), segundo Região de Saúde (RS) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

Casos e taxa de incidência de sífilis congênita (TISC), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 1986 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP) ; Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

Percentual de casos de sífilis congênita segundo realização de pré-natal materno e ano diagnóstico. Estado de




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

■ Sim ■ Não ■ Ign/Branco


Percentual de casos de sífilis congênita segundo momento do diagnóstico materno de sífilis. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP) ; Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.


Taxa de incidência de sífilis congênita (TISC) e taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por 1.000 nascidos vivos (NV), segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de residência. Estado de São Paulo, 2018*




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP); Fundação SEADE.

*Dados preliminares até 30/06/2019, sujeitos a revisão mensal.

■ TDSG ■ TISC




Total de casos de agravos DST/Aids notificados de janeiro a maio 2019 e 2020, estado de São Paulo*




Casos de sífilis na gestação notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*

Sífilis na Gestação




Casos de sífilis congênita notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*

Sífilis Congênita




Casos de gestante HIV notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*




Casos de crianças expostas ao HIV notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*


criança exposta



Casos de AIDS notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*




Casos de HIV notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020, estado de São Paulo*



**Casos de TB/HIV notificados de janeiro a maio, nos anos de 2016 a 2020,
estado de São Paulo***

TBHIV



“A SÍFILIS CONGÊNITA É UM PROBLEMA DE TODOS NÓS” E “JUNTOS PODEMOS MUDAR ESTA REALIDADE”



Para atingirmos a meta de redução dos casos de sífilis congênita no estado de São Paulo, o Programa Estadual de IST/Aids em parceria com o Cefor e com a Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde lançou, em 29/10/2018, o **“Curso básico de sífilis adquirida, gestante e congênita”**. Este curso, na metodologia EAD, busca qualificar o trabalho dos profissionais da atenção básica e maternidades no manejo da sífilis adquirida, sífilis na gestação e sífilis congênita, assim como, contribui para implementar as informações das vigilância epidemiológicas municipais e regionais.

Para acessar o EAD clique no link: <http://eadses.saude.sp.gov.br/>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de Covid-19 é importante atenção especial:

- No **acesso ao pré-natal** – não deixar gestantes sem PN,
- No **seguimento** das gestantes – não perder casos,
- No **diagnóstico** - ofertar TR ou convencional (Sífilis e HIV) para todas as gestantes,
- No **tratamento** – aplicar penicilina benzatina na Atenção Básica e completar o esquema terapêutico.
- Na **notificação** – não esquecer de preencher a FIE SG e SC e digitar no Sinan.

NÃO VAMOS ESQUECER DA SÍFILIS!!!

OUTUBRO 2020

**"V Semana Paulista
de Mobilização
contra a Sífilis: *"Os
desafios da sífilis
congênita em
tempos de Covid-
19"***

On line

OBRIGADA!

CARMEN@CRT.SAUDE.SP.GOV.BR

WWW.CRT.SAUDE.SP.GOV.BR

