



**Atenção Integral às
IST/HIV/Aids no contexto
da pandemia da Covid-19**



Manhãs Positivas


Web série cuidado contínuo em IST/HIV/Aids

- 28/07/2020 - Assistência ao HIV/Aids no contexto pandemia Covid-19
- 25/08/2020 – Monitoramento Clínico das PVHIV
- 30/09/2020 – Abandono do tratamento e do Serviço
- 28/10/2020 - Início precoce de TARV
- 24/11/2020 - Tuberculose Latente




Ofícios Circulares do MS

- Dispensação de TARV sempre que possível para 3 meses;
- Validade dos formulários de dispensação de antirretrovirais automaticamente ampliada no SICLOM para mais 90 dias, e depois, para os formulários ainda ativos, para mais 90 dias;
- Garantir imunização para influenza e pneumococo;
- Dispensação para PrEP até por 4 meses;




Ofícios Circulares do MS

- Priorizar testagem de HIV, hepatites virais e IST para pessoas sintomáticas para estes agravos e populações mais vulneráveis;
- Oferecer autoteste;
- Oferta de teste anti HIV para pacientes internados com síndrome respiratória;
- Reduzir a circulação de pessoas: PVHA estáveis com CV indetectável poderão ter apenas uma consulta presencial ao ano, sendo as demais feitas através de atendimento à distância;
- Garantir fluxo de atendimento em caso de intercorrências;



Ofícios Circulares do MS


- Para PVHIV com CD4 abaixo de 200 células avaliar indicação de profilaxias para infecções oportunistas;
- Telemedicina, assinatura digital de pedidos de exames, atestados e receitas;
 - Portaria Nº 467, do Ministério da Saúde (20 de março de 2020)
 - Ofício CFM nº 1756/2020-Cojur (19 de março de 2020)
- Teleconsulta;
 - Resolução COFEN Nº 634 (26 de março de 2020)
 - Resolução CFP Nº 04 (26 de março de 2020) desde 2018
 - CFESS Manifesta (23 de março de 2020)
- PrEP: manter início, controle laboratorial apenas com anti-HIV




Orientações do CRT

- Abordagem inicial para a identificação de sintomáticos respiratórios na entrada do prédio, com fornecimento de máscaras cirúrgicas (quando necessário) e orientação de higienização das mãos;
- Estabelecer fluxo de atendimento aos usuários sintomáticos respiratórios, deslocando todo o atendimento de síndrome gripal para o um local específico dentro da unidade;











PROCEDIMIENTO DE LA FICHA DE
- FICHA DE ASISTENCIA
- FICHA DE VIGILANCIA
- FICHA DE VIGILANCIA
- FICHA DE VIGILANCIA
- FICHA DE VIGILANCIA


Entre cada paciente:
- Fregar las
- Higienizar equitativamente e
- Higienizar
- Fregar de nuevo nuevamente

Diagrama de flujo de un procedimiento de atención al paciente.

Diagrama de flujo de un procedimiento de atención al paciente.









Orientações do CRT

- Adiar as consultas ambulatoriais e exames de rotina de usuários estáveis e assintomáticos; (exceto gestantes e TB)
- Fornecimento das receitas de medicamentos de uso contínuo, bem como o acesso organizado à farmácia de dispensação;
- As equipes técnicas identificarão os casos agendados cuja avaliação presencial/realização de exames seja imprescindível;
- Reagendar os procedimentos eletivos, comunicando os usuários das novas datas.




Orientações do CRT

- Disponibilizar meios de contato com o serviço (e-mail, WhatsApp ou telefone) para contato para dúvidas ou orientações de cuidado;
- Garantir primeira consulta presencial para casos novos com coleta de exames e oferta de TARV no mesmo dia ou o mais precoce possível;
- Manter contato remoto nos casos de início de TARV nos primeiros 30 dias;





Orientações do CRT


- Dispensar ARV para 90 dias e para profilaxia pré-exposição (PrEP) para 120 dias;
- Ampliar a validade dos formulários de dispensação de medicamentos antirretrovirais para mais 90 dias;
- Transferir esperas de serviços, como farmácia e outros, para ambientes ventilados e mais espaçosos, como áreas externas;
- Manter as salas de espera com o menor número possível de usuários, propiciando distanciamento físico seguro.















PAC

PACIENTE 2


PACIENTE 1


00000



Possibilidade de entrega dos ARV

- Outras estratégias para manutenção de TARV com prioridade para usuários mais vulneráveis a formas graves da COVID-19 ou dificuldade na mobilidade:
 - Familiares ou amigos
 - Parcerias com ONG
 - Articulação com Atenção Básica





DESAFIOS

- Ampliar a oferta de autotestes com inclusão de parceiros como atenção básica, ONG, serviços de tuberculose....
- Focar o teste rápido para populações mais vulneráveis
- Manter busca de casos de abandono