PEP SEXUAL

4º ENCONTRO DE CTA DO ESP

Denize Lotufo Estevam
Infectologista
Gerente da Assistência do CRT/DST/AIDS

Estratégias de Implementação

- Duas Videoconferências Estaduais sobre PEP sexual – atualização e implantação dez/2010 e out/2011
- Criação de uma Rede Única de atendimento às profilaxias pós-exposição ocupacional, sexual e violência
- Criação de um hotsite com informações detalhadas sobre PEP sexual

Estratégias de Implementação

- A partir de 2012 realização de Fóruns Regionais de Prevenção com inclusão do tema da PEP sexual (dois por ano)

- •Discussão do tema nos dois encontros regionais de CTA em 2013

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

PEP

Profilaxia Pós Exposição

O que é | Dúvidas Frequentes | Buscar Serviços | Onde fazer o teste | Entre em Contato | Apoio

Dúvidas mais frequentes:

Quando a PEP é indicada?

Você pode buscar a PEP em serviços de saúde credenciados depois de uma relação sexual com penetração sem camisinha com alguém que você sabe que vive com HIV ou em casos em que a camisinha rompeu ou sa

Rede Única de Atendimento

O que é | Dúvidas Frequentes | Buscar Serviços | Onde fazer o teste | Entre em Contato | Apoio

Buscar um serviço mais próximo:

Lembre-se, o atendimento para quem possa ter se exposto ao vírus do HIV por meio sexual ou sofreu violência sexual ou ainda, teve um acidente ocupacional (para profissionais da saúde) deve ser sempre considerado uma **URGÊNCIA MÉDICA**.

Busca de Serviços para Profilaxia pós exposiçao ocupacional, sexual e violência

Para realizar a busca utilize o campo abaixo, você pode realizar consultas por: **Nome, CNES, Município ou GVE**, ou para listar todos os serviços cadastrados clique dentro do campo de busca e aperte a tecla **"Enter"**.

Caso queira cadastrar um serviço clique aqui, em caso de dúvidas entre em contato pelos telefones: (11) 5084-5235 / 5083-8780

ou se preferir pelo e-mail: assistencia@crt.saude.sp.gov.br

CADASTRO DE UNIDADES

Clique aqui para buscar por Nome, CNES, Município ou GVE

Estratégias

- **Disponibilização de arte para reprodução e distribuição de 30 mil folders para profissionais de saúde e candidatos a uso de PEP sexual**



PEP SEXUAL

Profilaxia Pós Exposição Sexual

O QUE É?

Uma medida de prevenção que consiste na utilização de medicamentos para diminuir a chance de infecção pelo HIV após possível contato com o vírus.

QUEM DEVE PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE?

Pessoas que passaram pelas situações de risco abaixo:

- *Não utilização ou rompimento de camisinha durante a relação sexual com uma pessoa sabidamente soropositiva para HIV.*
- *Relações sexuais com parceiro(a) sem sorologia conhecida, sobretudo se pertencente à população de maior prevalência (número de casos) da infecção pelo HIV. No Brasil, profissionais do sexo, usuários(as) de drogas, travestis e homens que fazem sexo com outros homens possuem uma prevalência maior quando comparados à população geral.*

Frente

Estratégias

- Disponibilização de arte para reprodução e distribuição de 50 banners para divulgação da PEP sexual nos serviços – "Aqui tem PEP"



SICLOM

6 -Categoria do Usuário

- ☐ Gestante HIV +
- ☐ Recém-nascido de mãe HIV+
- ☐ Parturiente
- ☐ Aids – Adulto
- ☐ Aids – Criança

- Profilaxia Pós-exposição

- ☐ Ocupacional
- ☐ Violência Sexual
- ☐ Casais Sorodiscordantes
- ☐ Compartilhamento de seringa
- ☐ Exposição Sexual Ocasional
- ☐ Reprodução
- ☐ Outros _____

Distribuição de 255 serviços cadastrados para a realização de PEP sexual em 169 municípios até julho de 2013 segundo GVE
**** em fase de atualização***



Implantação de PEP no ESP



Implantação de PEP no ESP



Realização de PEP sexual em 101 municípios do estado de São Paulo entre 2011 e 2014 – Nº total de dispensas de ARV



68% (98/145) dos municípios PAM dispensaram ARV PEP SEXUAL

Dispensação de ARV com finalidade de PEP Sexual dentre os municípios que implantaram a estratégia N=101



Dentre os 50 municípios presentes, 31 (62%) realizaram mais de 10 dispensas de ARV com finalidade de PEP Sexual entre 2011 e 2014

(*Fonte – SICLOM)*

Oferta de PEP Sexual nos CTA

N=127 *Fonte = Cadastro de Unidades de Testagem julho 2014*



Perfil dos usuários de PEP sexual do CRT DST/AIDS de 2010 a 2014

IDADE (N = 362)

Total (N)	Missing	Unique	Min	Max	Mean	StDev	Percentile						
							.05	.10	.25	.50 Median	.75	.90	.95
362	51 (12.3%)	36	16.00	58.00	30.16	7.12	20.00	22.00	25.00	29.00	34.00	39.00	44.00

Lowest values: 16, 16, 17, 17, 18

Highest values: 50, 52, 52, 52, 58

SEXO (N = 373)

Counts/frequency: masculino (331, 88.7%), feminino (42, 11.3%)



RAÇA/COR (N = 369)

Counts/frequency: branca (247, 66.9%), preta (20, 5.4%), amarela (15, 4.1%), parda (55, 14.9%), indigena (0, 0%), não informado (32, 8.7%)



ESCOLARIDADE (N = 376)

Counts/frequency: nenhuma (1, 0.3%), alfabetizado (0, 0%), fundamental incompleto (8, 2.1%), fundamental completp (9, 2.4%), médio incompleto (14, 3.7%), médio completo (80, 21.3%), superior incompleto (82, 21.8%), superior completo (163, 43.4%), ignorado (19, 5.1%)



FORMA QUE CONHECEU A PEP SEXUAL (N = 354)

Counts/frequency: não conhecia / oferecida pelo serviço (58, 16.4%), internet (102, 28.8%), imprensa (11, 3.1%), profissional de saúde (27, 7.6%), serviços de saúde (86, 24.3%), parceiro (33, 9.3%), outros (74, 20.9%)



QUANTAS VEZES FEZ USO DE PEP SEXUAL (N = 43)

Total (N)	Missing	Unique	Min	Max	Mean	StDev	Percentile						
							.05	.10	.25	.50 Median	.75	.90	.95
43	370 (89.6%)	6	1.00	4.00	1.35	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50	3.00

USO ANTERIOR DE PEP SEXUAL (N = 379)

Counts/frequency: não (333, 87.9%), sim (45, 11.9%), não informado (1, 0.3%)



PERTENCE A POPULAÇÃO DE MAIOR PREVALENCIA? (N = 372)

Counts/frequency: não pertence (138, 37.1%), transexual (7, 1.9%), travesti (11, 3%), HSH/gay/homossexual (198, 53.2%), profissional do sexo (24, 6.5%), não pertence a nenhuma (3, 0.8%), outras (16, 4.3%), não informou (7, 1.9%)



PARCEIRO SEXUAL PERTENCE A POP. DE MAIOR PREVALENCIA? (N = 366)

Counts/frequency: não pertence (48, 13.1%), transexual (0, 0%), travesti (15, 4.1%), HSH/gay/homossexual (173, 47.3%), profissional do sexo (61, 16.7%), HIV+ (71, 19.4%), outras (27, 7.4%), não informado (27, 7.4%)



JÁ HAVIA REALIZADO EXAME DE HIV ANTERIORMENTE? (N = 317)

Counts/frequency: não (204, 64.4%), sim (78, 24.6%), não informado (35, 11%)



OMS DIRETRIZES 2014 PEP

- Revisão sistemática:

- Foco no risco e não no tipo de exposição
- Esquema ARV único para todas as PEP
- Prescrever esquema ARV completo e trabalhar adesão

- Esquemas: TDF+XTC+LPVr ou ATVr ou Raltegravir ou DRVr ou EFV



Obrigada pela atenção!

Denize Lotufo Estevam

Contato

Dlotufo@crt.saude.sp.gov.br