

## DERMATOMIOSITE E POLIMIOSITE

Portaria MS-SAS nº 1.692, de 22 de novembro de 2016 ([Protocolo na íntegra](#))

### Medicamentos

- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Hidroxicloroquina 400 mg – comprimido](#)
- [Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável – frasco](#)
- [Metotrexato 25 mg/mL – injetável, ampola de 2 mL; 2,5 mg – comprimido](#)

### CID's contemplados

M33.0, M33.1, M33.2

### Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

#### 1ª solicitação

#### 1. APRESENTAR 2 DOS 3 EXAMES ABAIXO:

- Biópsia muscular;
- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase) ou Aldolase ou DHL (Desidrogenase Láctica) ou TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) e TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Eletromiografia.

#### Renovação da Continuidade

##### PARA AZATIOPRINA:

##### Trimestralmente:

- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Testes de função hepática: Dosagem sérica – fosfatase alcalina, TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) e TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

##### À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase);

DERMATOMIOSITE E POLIMIOSITE (Atualizado em 05/09/2018)

## COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica – aldolase;
- Dosagem sérica – DHL (Desidrogenase Láctica).

### PARA CICLOSPORINA:

#### Trimestralmente:

- Dosagem sérica – creatinina.

#### A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald:  $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Dosagem sérica – sódio;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica – aldolase;
- Dosagem sérica – DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

### PARA HIDROXICLOROQUINA:

#### À critério do médico prescritor:


- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Relatório médico, elaborado por médico oftalmologista, com avaliação oftalmológica.

### PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA:

#### À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica);
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

DERMATOMIOSITE E POLIMIOSITE (Atualizado em 05/09/2018)



# COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

## PARA METOTREXATO:

### Trimestralmente:

- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – uréia.

### À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica - CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica - aldolase;
- Dosagem sérica - DHL (Desidrogenase Láctica).

DERMATOMIOSITE E POLIMIOSITE (Atualizado em 05/09/2018)