

HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES

Portaria nº 84, de 19 de dezembro de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

[Nota Técnica Conjunta CEA/CAF/ SES-SP e PEHV/CVE/CCD/SES-SP nº 02, de 04 de dezembro de 2020.](#)

Medicamentos

- [Alfaepoetina 10.000 UI injetável – frasco-ampola](#)
- [Alfapeginterferona 2A 180 mcg – seringa preenchida](#)
- [Filgrastim 300 mcg injetável - frasco](#)
- [Glecaprevir 100mg + pibrentasvir 40mg – comprimido revestido](#)
- [Ribavirina 250 mg – cápsula](#)
- [Sofosbuvir 400 mg – comprimido revestido](#)
- [Sofosbuvir 400 mg + ledipasvir 90 mg – comprimido revestido](#)
- [Sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100mg – comprimido revestido](#)

CID's contemplados

B17.1 e B18.2

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

Hepatite C Aguda (CID-10 B17.1 e Crônica (CID-10 B18.2):

PARA ALFAPEGINTERFERONA, SOFOSBUVIR, GLECAPREVIR + SOFOSBUVIR:

- [Relatório médico específico para Hepatite C Crônica – modelo padrão SES/SP.](#)
- Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses;
- Genotipagem (realizado em qualquer tempo)
- β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização;

Adicionalmente:

HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES (Atualizado em 23/03/2021)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA GRAVE (com depuração de creatinina inferior a 30mL/min)

- Taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela creatinina sérica).

PARA GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR, RIBAVIRINA, VELPATASVIR + SOFOSBUVIR:

1. Cópia dos exames:

a) Pacientes adultos (com 18 anos ou mais), que não fizeram tratamento prévio com antivirais de ação direta e sem resultado de exame de genotipagem para o HCV:

- Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses;
- β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização;

b) Demais pacientes adultos (com 18 anos ou mais):

- Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses;
- β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização
- Genotipagem (realizado em qualquer tempo).
- Adicionalmente:

PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA GRAVE (com depuração de creatinina inferior a 30mL/min)

- Taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela creatinina sérica).

PARA ALFAEPOETINA E FILGRASTIM:

- Hemograma

Renovação da Continuidade

PARA ALFAPEGINTERFERONA, RIBAVIRINA, DACLATASVIR E SOFOSBUVIR:

Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA ALFAEPOETINA E FILGRASTIM:

Trimestralmente

- Hemograma

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).

HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES (Atualizado em 23/03/2021)

