

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL

Portaria conjunta nº 1, de 05 de janeiro de 2021 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Micofenolato de Mofetila 500 mg – comprimido](#)
- [Micofenolato de Sódio 180 mg e 360 mg – comprimido](#)
- [Metilprednisolona 500 mg injetável - ampola](#)
- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Imunoglobulina humana 2,5 g e 5,0 g injetável – frasco](#)
- [Tacrolimo 1 mg e 5 mg – cápsula](#)
- [Everolimo 0,5 mg; 0,75 mg; e 1,0 mg – comprimido](#)
- [Sirolimo 1 mg e 2 mg – drágea](#)

CID's contemplados

T86.1, Z94.0

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

Não são exigidos exames de diagnóstico inicial, porém, o médico prescritor deverá descrever no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a data do transplante se doador vivo (HLA idêntico ou distinto) ou falecido e a condição clínica do transplantado frente ao tratamento imunossupressor atualmente empregado, bem como os medicamentos já utilizados.

PARA REJEIÇÃO AGUDA CELULAR:

A critério do médico prescritor:


- Dosagem sérica – creatinina.

PARA REJEIÇÃO AGUDA MEDIADA POR ANTICORPOS:

A critério do médico prescritor:

- Pesquisa anticorpo anti-HLA (Antígeno Leucocitário Humano);
- Biópsia renal.

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL (Atualizado em 19/03/2021)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA REJEIÇÃO CRÔNICA:

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – creatinina;
- Ultrassonografia e doppler colorido da vasculatura do enxerto;
- Biópsia renal.

Renovação da Continuidade

PARA MICOFENOLATO DE MOFETILA E MICOFENOLATO DE SÓDIO:

A critério do médico prescritor:

- Hemograma.

PARA AZATIOPRINA:

A critério do médico prescritor:

- Hemograma;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica – bilirrubinas.

PARA CICLOSPORINA, TACROLIMO:

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – fármaco;
- Hemograma;
- Glicemia de jejum;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;


Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Dosagem sérica – sódio;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA IMUNOGLOBULINA: Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA EVEROLIMO E SIROLIMO:

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL (Atualizado em 19/03/2021)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

A critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica – fármaco;
- Glicemia de jejum;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL **ou** cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Glicemia de jejum.
- Dosagem sérica – sódio;
- Dosagem sérica – potássio.

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL (Atualizado em 19/03/2021)