

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA

Portaria nº 1.316, de 22 de novembro de 2013 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Imunoglobulina humana 5,0 g injetável – frasco](#)
- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclofosfamida 50 mg – drágea](#)
- [Danazol 100 mg – cápsula](#)

CID's contemplados

D69.3

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA:

- Hemograma com contagem de plaquetas;

PARA AZATIOPRINA:

- Hemograma.

À critério do médico prescritor:

- β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil).

PARA CICLOFOSFAMIDA E DANAZOL :

- Hemograma.

Renovação da Continuidade

PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA:

Mensalmente:

- Hemograma com contagem de plaquetas.

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (Atualizado em 24/10/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA AZATIOPRINA:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

À critério do médico prescritor:

- Hemograma.

PARA CICLOFOSFAMIDA:

Trimestralmente:

- Creatinina.

À critério do médico prescritor:

- Hemograma.

PARA DANAZOL:

Semestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald.

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

À critério do médico prescritor:

- Hemograma.

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (Atualizado em 24/10/2018)