

SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Portaria Conjunta nº 01, de 10 de janeiro de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Tacrolimo 1 mg e 5 mg – cápsula](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Ciclofosfamida 50 mg – drágea](#)

CID's contemplados

N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA TACROLIMO E CICLOSPORINA:

- Proteinúria de 24 horas ou proteinúria de amostra isolada;
- Dosagem sérica – albumina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL **ou** cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Pesquisa de FAN (Fator Antinuclear)
- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C);
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B);
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana);
- Sorologia - Toxoplasmose;
- Dosagem sérica – creatinina.

PARA CICLOFOSFAMIDA:

- Proteinúria de 24 horas ou proteinúria de amostra isolada;
- Dosagem sérica – albumina;

SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES (Atualizado em 21/09/2018)

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Pesquisa de FAN (Fator Antinuclear)
- Sorologia - Anti-HCV (Anti-Vírus da Hepatite C);
- Sorologia - HbsAG (Antígeno de superfície – Hepatite B);
- Sorologia - Anti-HIV (Anti-Vírus da Imunodeficiência Humana);
- Sorologia – Toxoplasmose.

Renovação da Continuidade

PARA TACROLIMO:

- Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA CICLOSPORINA:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – ciclosporina.

PARA CICLOFOSFAMIDA:

Trimestralmente:

- Hemograma.