



## ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA ADOLESCENTES 2006

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA <sup>1</sup>	HEPATITE B dT - DUPLA ADULTO <sup>2</sup> SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA – SCR <sup>3</sup> FEBRE AMARELA <sup>4</sup>	PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE DOSE ÚNICA DOSE INICIAL
2 MESES APÓS A PRIMEIRA DOSE	HEPATITE B <sup>5</sup> dT - DUPLA ADULTO	SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE
6 MESES APÓS A SEGUNDA DOSE	HEPATITE B <sup>6</sup> dT - DUPLA ADULTO	TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE
A CADA 10 ANOS E POR TODA A VIDA <sup>7</sup>	DUPLA ADULTO	REFORÇO

1- Caso o adolescente apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado.

2- Caso o adolescente já tenha recebido anteriormente 3 doses ou mais doses das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma dose se reforço, se já decorreu 10 anos da última dose.

3- Caso o adolescente já tenha recebido uma dose da vacina SCR após os 12 meses de idade, esta aplicação não é necessária.

4- Nas regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez anos.

5- O intervalo mínimo entre a primeira e segunda doses da vacina contra a hepatite B é de 30 (trinta) dias.

6 - O intervalo para a terceira dose pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.

**7- Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.**

**dT – vacina dupla, tipo adulto, contra a difteria e o tétano**