



Calendários Vacinais

GLOSSÁRIO

BCG: vacina contra tuberculose

VIP: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)

Hepatite B: vacina hepatite B (recombinante)

Pentavalente: vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae* b (conjugada)

Rotavírus: vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada)

Pneumocócica 10-valente: vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)

Meningocócica C: vacina meningocócica C (conjugada)

VOP: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)

Febre Amarela: vacina febre amarela (atenuada)

Sarampo-Caxumba-Rubéola: vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada)

DTP: vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis

dT : vacina adsorvida difteria e tétano adulto

Influenza: vacina influenza (fracionada, inativada)

Pneumocócica 23-valente: vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)

Tetraviral: vacina sarampo, caxumba, rubéola, varicela (atenuada)

Hepatite A: vacina adsorvida hepatite A (inativada)

HPV – vacina papiloma vírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)



Calendário da Criança até 6 anos de idade - 2014

Idade	Vacina
Ao nascer	BCG, Hepatite B
2 meses	VIP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente
3 meses	Meningocócica C
4 meses	VIP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente
5 meses	Meningocócica C
6 meses	VOP, Pentavalente (DTP-Hib-HB), Pneumocócica 10 valente
9 meses	Febre amarela
12 meses	Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Meningocócica C, Hepatite A
15 meses	VOP, DTP, Pneumocócica 10 valente, Tetraviral (SCR-Varicela)
5 anos	VOP, DTP
15 anos	dT
6m a < 5 anos	Influenza



Calendário para crianças maiores de 7 anos de idade e adolescentes - 2014

Intervalo entre as doses	Vacina	Esquema
Primeira visita	BCG Hepatite B dT Poliomielite Sarampo-Caxumba-Rubéola	Dose única Primeira dose Primeira dose Primeira dose Primeira dose
2 meses após a primeira visita	Hepatite B dT Poliomielite Febre amarela	Segunda dose Segunda dose Segunda dose Dose inicial
4 meses após a primeira visita	Hepatite B dT Poliomielite Sarampo-Caxumba-Rubéola	Terceira dose Terceira dose Terceira dose Segunda dose
a cada 10 anos	dT Febre amarela	Dose reforço

Nota: Vacina Papiloma Vírus Humano (HPV) – Para meninas com 11, 12, e 13 anos de idade. Esquema estendido de 3 doses: 0, 6 e 60 meses.



Calendário da gestantes e puérperas - 2014

Intervalo entre as doses	Vacina	Esquema
Primeira visita	dT Hepatite B	Primeira dose Primeira dose
2 meses após a primeira visita	dT Hepatite B	Segunda dose Segunda dose
6 meses após a primeira visita	dT Hepatite B	Terceira dose Terceira dose
Em qualquer fase da gestação	Influenza	Dose única
Puerpério	Sarampo-Caxumba-Rubéola Influenza	Dose única



Calendário do adulto entre 20 e 59 anos - 2014

Intervalo entre as doses	Vacina	Esquema
Primeira visita	dT Hepatite B (pessoas até 49 anos) Sarampo-Caxumba-Rubéola (pessoas nascidas a partir 1960)	Primeira dose Primeira dose Dose única
2 meses após a primeira visita	dT Hepatite B Febre Amarela	Segunda dose Segunda dose Dose inicial
4-6 meses após a primeira visita	dT Hepatite B	Terceira dose Terceira dose
A cada 10 anos	dT Febre amarela	Dose reforço



Calendário do Idoso - 2014

Intervalo entre as doses	Vacina	Esquema
Primeira visita	dT Febre amarela	Primeira dose Dose inicial
2 meses após a primeira visita	dT	Segunda dose
4 -6 meses após a primeira visita	dT	Terceira dose
Anualmente	Influenza	
A cada 10 anos	dT Febre amarela	Reforço

Nota: Vacina pneumocócica 23-valente – indicada durante as ‘campanhas nacionais de vacinação para pessoas com 60 ou mais anos’ para indivíduos que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso.