



Calendário de Vacinação no Estado de São Paulo

Parte da história da Divisão de Imunização está na mudança dos calendários vacinais, quer devido à mudança na situação epidemiológica das doenças imunopreveníveis ou da inclusão de novas vacinas.

A primeira Norma do Programa de Vacinação da Secretaria da Saúde Pública (antiga denominação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) foi implantada em **1968** e recomendava:

- BCG oral: entre 3 e 7 dias de vida, realização de teste tuberculínico aos 12 meses de idade e revacinação nos casos não reatores.
- Vacina contra poliomielite e DPT (contra difteria, coqueluche e tétano): três doses básicas com intervalo de dois meses e três doses básicas da vacina DPT com intervalo de um mês. Naquela época, o intervalo mínimo entre as doses de Sabin era de um mês. O primeiro reforço da vacina Sabin e DPT era aplicado entre 15 e 18 meses de idade e o segundo entre 3 e 4 anos; um terceiro reforço, somente contra tétano, ao entrar na escola, aos 7 anos.
- Vacina contra varíola aplicada aos 8 meses e aos 5 anos de idade. Reforços a cada cinco anos.
- A vacina dupla tipo infantil (DT) era recomendada: entre 4 e 6 anos de idade.
- Vacinação de gestantes: especialmente na área rural, a partir do 5º mês de gestação. Esquema de três doses com intervalo de um mês.

Calendário de 1975

- Substituição da vacina BCG oral pela BCG-ID, um produto mais termoestável.
- Introdução da vacina dupla tipo adulto (dT) para as pessoas a partir de 7 anos de idade. O toxóide tetânico (TT) era aplicado para os maiores de 14 anos.

Calendário de 1979

- A vacina contra varíola deixou de ser obrigatória no primeiro ano de vida. A partir de maio de 1980, com a certificação da erradicação global da doença pela Assembléia Mundial de Saúde, a vacinação foi extinta.

- Introdução da segunda dose da vacina contra o sarampo aos 15 meses de idade.

Calendário de 1984

- Ampliação da faixa etária de aplicação da vacina BCG-ID, para durante o primeiro ano de vida.

- Vacina contra o sarampo: dose única aos 9 meses de idade

- Vacina contra a poliomielite e DTP: ambas as vacinas passam a ser aplicadas simultaneamente aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Neste ano foi implantado o Sistema Estadual de Notificação e Investigação de Eventos Adversos.

Calendário de 1988

- Vacina BCG aplicação no primeiro mês de vida.

- Vacina contra o sarampo: reintrodução da segunda dose aos 15 meses de idade.

- Reforços da vacina contra poliomielite e DTP: o primeiro reforço é antecipado para 15 meses e o segundo, transferido para 5 a 6 anos de idade.

- Introdução dos reforços da vacina dT a cada dez anos.

Calendário de 1998

A norma de 1998, com edição revisada publicada em 2000, referendava:

- A utilização da vacina tríplice viral aos 15 meses (SCR – contra o sarampo, caxumba e rubéola), introduzida em junho de 1992, após campanha de vacinação indiscriminada para as crianças de um a dez anos de idade (Resolução SS- 375 de 26-11-1992 e Resolução 234 de 31-07-1992).

- Introdução da vacina contra hepatite B ao nascer, simultaneamente com a vacina BCG-ID. A vacina contra hepatite B foi introduzida a partir de 1990 para pacientes politransfundidos e renais crônicos em tratamento em Centros de Diálise. Em 1991 a sua utilização foi ampliada para os profissionais de saúde. A partir de setembro de 1998 passou a fazer parte do calendário básico (Resolução SS-28 de 10-02-1999, corrigida em 03-03-1999).

- Vacina contra febre amarela: passa a ser aplicada na rotina, a partir dos 9 meses de idade, nos municípios com infestação domiciliar de *Aedes aegypti*.

- Introdução da vacina contra H. influenza, simultaneamente com a vacina DPT, aplicada aos 2, 4 e 6 meses, a partir de julho de 1999 (Resolução SS-145, de 19-10-1999). A partir de 2002 os produtos são aplicados sob a forma combinada conhecida na rede pública como vacina tetravalente.

Embora novas edições da Norma de Imunização não tenham sido publicadas, algumas atualizações ocorreram:

- em 2003, recomendação da vacina tríplice viral – SCR aos 12 meses, com a suspensão da dose da vacina contra o sarampo aos 9 meses.