



Enfrentamento do COVID-19 em gestantes e puérperas

Região Metropolitana de São Paulo

Rossana Pulcineli Vieira Francisco

**Hospital das Clínicas da
FMUSP**



**Hospital Universitário
USP**



**Faculdade de Medicina da
USP**



Objetivos

1. Verificar se há casos que necessitam de discussão sobre encaminhamento.

- TODOS os encaminhamentos continuarão sendo via sistema CROSS
- Não podemos atrasar a transferência para discutir o caso na reunião. Sempre que julgarem necessário solicitem a transferência mas se houver dúvida podemos discutir aqui

Objetivos

2. Discutir casos que estejam internados e que continuarão sob cuidado dos hospitais onde estão.

Organização da reunião

- Segunda a sexta
- 13:30 às 14:30h
- Será mantido o mesmo link
- Ordem de discussão:
 - dúvidas de transferências
 - discussão de casos internados nos hospitais da região
 - dúvidas dos participantes pelo “chat”

Todos são bem vindos mas não necessariamente todos precisam entrar!
A ideia é dar suporte e agilizar encaminhamentos para os serviços que tiverem estas necessidades, no dia em questão

Progressão de sinais e sintomas

- Sintomas leves: recuperação domiciliar
- Sintomas moderados: internação em enfermaria)
- Sintomas graves: UTI

Critérios para internação - COVID

1. Desconforto respiratório caracterizado por:

- Uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz
- Taquipnéia: $FR \geq 24$ ipm
- $Sp O_2 < 93\%$ em ar ambiente (cuidado com vitalidade fetal)

Internação – COVID suspeito ou confirmado

Suporte de O2:

Cateter Nasal de O2: Maximo 6l/min



Venturi: titular fluxo conforme demanda (até 50%)



IOT

Quando for necessário cateter Nasal para manter oxigenação: Transferir a gestante para serviço com UTI materna, UTI neo e Obstetrícia

Critério internação em UTI

- **Sem melhora da saturação de oxigênio apesar da oferta de O₂ (SatO₂ <93% com oferta de 6L/min);**
- **Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa nasal) apesar da oferta de O₂;**
- **Relação pO₂/FiO₂ < 200;**
- **Hipotensão arterial;**
- **Alteração da perfusão periférica (tempo de enchimento capilar)**
- **Alteração do nível de consciência;**
- **Oligúria**

Se tudo der certo,
vamos poder cuidar melhor
de nossas gestantes e
puérperas mesmo quando
a pandemia passar!