

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA

Portaria Conjunta SAES/SECTICS Nº 10, de 13 de setembro de 2024 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamento

- [Dapagliflozina 10 mg por comprimido.](#)
- [Sacubitril valsartana sódica hidratada 50 mg, 100 mg e 200 mg por comprimido.](#)

CID's contemplados

I50.0; I50.1; I50.9

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA SACUBITRIL VALSARTANA:

- [Relatório médico descrevendo os critérios médicos utilizados no diagnóstico;](#)
- Laudo do Ecocardiograma com fração de ejeção ($\leq 35\%$);
- Dosagem de peptídeos natriuréticos BNP (> 150 pg/mL) ou NT-ProBNP (> 600 pg/mL);

Atenção: Para paciente em uso prévio do medicamento sacubitril valsartana sódica hidratada, o médico prescritor deverá justificar no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) ou em relatório médico específico, as condições clínicas e laboratoriais do paciente, considerando que os exames laboratoriais de critérios de inclusão demonstram estabilidade clínica.

Conforme PCDT, para início de tratamento, o paciente deverá ter idade mínima de 18 anos e idade inferior de 75 anos. Os pacientes que iniciaram o uso do medicamento antes de 75 anos, terão a manutenção do tratamento até 130 anos.

A critério do médico prescritor:

- Relatório médico apresentando a classificação com base nos critérios de Boston para classificação da probabilidade de desenvolver IC.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA (Atualizado em 12/03/2025)

PARA DAPAGLIFLOZINA:

- Relatório médico descrevendo os critérios médicos utilizados no diagnóstico:
 - Classificação Funcional da New York Heart Association (NYHA);
 - Presença de sintomas como dispneia aos esforços, sinais de congestão, piora clínica com internações recentes.
- Laudo do Ecocardiograma com fração de ejeção.

A critério do médico prescritor:

- Relatório médico apresentando a classificação com base nos critérios de Boston para classificação da probabilidade de desenvolver IC.
- Eletrocardiograma;
- Radiografia de tórax.

Renovação da Continuidade**PARA DAPAGLIFLOZINA:****A critério médico do médico prescritor:**

- Eletrocardiograma;
- Radiografia de tórax.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA (Atualizado em 12/03/2025)