

RETOCOLITE ULCERATIVAPORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS Nº 9, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 ([Protocolo na Íntegra](#) e [Protocolo Resumido](#))**Medicamentos**

- [Azatioprina 50 mg – comprimido](#)
- [Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Infliximabe 10 mg/mL injetável – frasco-ampola com 10mL](#)
- [Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg – comprimido;](#)
- [Mesalazina 250 mg, 500 mg e 1000 mg – supositório;](#)
- [Mesalazina 1 g + diluente 100 mL;](#)
- [Sulfassalazina 500 mg – comprimido](#)
- [Tofacitinibe 5mg – comprimido revestido](#)
- [Vedolizumabe 300 mg/mL injetável – frasco-ampola](#)

K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8


Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo**1ª solicitação****PARA AZATIOPRINA:**

- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU, realizado nos últimos 12 meses;
- Hemograma;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA CICLOSPORINA:

- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU, realizado nos últimos 12 meses;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Hemograma;
- Dosagem sérica – ácido úrico;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – magnésio;

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 01/10/2025)



- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald.

$$\text{Equação de Friedewald: LDL} = [(\text{Colesterol total}) - \text{HDL}] - (\text{Triglicerídeos}/5)$$

PARA MESALAZINA E SULFASSALAZINA:

- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU, realizado nos últimos 12 meses;
- Hemograma;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Urina tipo I.

PARA INFLIXIMABE:


- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU, realizado nos últimos 12 meses;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); realizado nos últimos 3 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica). realizado nos últimos 3 meses;
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa, realizado nos últimos 12 meses;
- Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
- Prova de Mantoux - PPD (teste tuberculínico) ou equivalente (teste IGRA), realizado nos últimos 12 meses.
- À critério do médico: Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

PARA TOFACITINIBE:

- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU realizado nos últimos 12 meses;
- Dosagem sérica – creatinina, realizado nos últimos 3 meses;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética), realizado nos últimos 3 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica), realizado nos últimos 3 meses;
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa, realizado nos últimos 12 meses;
- Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax;
- Prova de Mantoux – PPD (teste tuberculínico) ou equivalente (teste IGRA), realizado nos últimos 12 meses;
- À critério médico: Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

PARA VEDOLIZUMABE

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 01/10/2025)



- Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) e alterações histopatológicas sugestivas de RCU, realizado nos últimos 12 meses;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); realizado nos últimos 3 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica). realizado nos últimos 3 meses;
- Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa, realizado nos últimos 12 meses:
 - Laudo/relatório médico de Radiografia de tórax
 - Prova de Mantoux - PPD (teste tuberculínico) ou equivalente realizado nos últimos 12 meses.

Renovação da Continuidade**PARA AZATIOPRINA:****Trimestralmente:**

- Hemograma;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA CICLOSPORINA:**Trimestralmente:**

- Hemograma;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Dosagem sérica – ácido úrico;
- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – magnésio;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald.


Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

PARA MESALAZINA E SULFASSALAZINA:**Quadrimestralmente:**

- Hemograma;
- Dosagem sérica – creatinina;
- Urina tipo I.

PARA INFLIXIMABE:**Trimestralmente:**

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 01/10/2025)





COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA TOFACITINIBE:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – creatinina;
- Hemograma completo;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética).
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA VEDOLIZUMABE

Trimestralmente:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 01/10/2025)

