

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE

Portaria Conjunta nº 8, de 30 de julho de 2019 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Atorvastatina 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg – comprimido](#)
- [Bezafibrato 200 mg – drágea ou comprimido e 400 mg – comprimido de desintegração lenta](#)
- [Ciprofibrato 100 mg – comprimido](#)
- [Fenofibrato 200 mg – cápsula e 250 mg – cápsula de liberação retardada](#)
- [Genfibrozila 600 mg e 900 mg – comprimido](#)
- [Pravastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg – comprimido](#)

CID's contemplados

E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA ÁCIDO NICOTÍNICO:

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
 - Diabetes melito;
 - Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
 - Evidência clínica de doença aterosclerótica.
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante); - realizado nos últimos 03 meses;

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE
(Atualizado em 19/11/2025)

- Dosagem sérica – colesterol total- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

$$\text{Equação de Friedewald: LDL} = [(\text{Colesterol total}) - \text{HDL}] - (\text{Triglicerídeos}/5)$$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.
- Descrever, no campo “Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?” do LME se paciente possui intolerância ou contraindicação ao tratamento com estatinas.

PARA ATORVASTATINA E PRAVASTATINA:

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
 - Diabetes melito;
 - Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
 - Evidência clínica de doença aterosclerótica
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – colesterol total) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

$$\text{Equação de Friedewald: LDL} = [(\text{Colesterol total}) - \text{HDL}] - (\text{Triglicerídeos}/5)$$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE
(Atualizado em 19/11/2025)

- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tireoestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
 - o β -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

Renovação da Continuidade**PARA ATORVASTATINA, PRAVASTATINA E ACIDO NICOTINICO:****Semestralmente ou a cada alteração de dose:**

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:**Semestralmente ou a cada alteração de dose:**

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

Semestralmente para os casos de hipertrigliceridemia:

- Dosagem sérica – triglicerídeos.