

# DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE

Portaria Conjunta nº 8, de 30 de julho de 2019 ([Protocolo na íntegra](#))

## Medicamentos

- [Ácido Nicotínico 250 mg, 500 mg e 750 mg – comprimido de liberação prolongada](#)
- [Atorvastatina 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg – comprimido](#)
- [Bezafibrato 200 mg – drágea ou comprimido e 400 mg – comprimido de desintegração lenta](#)
- [Ciprofibrato 100 mg – comprimido](#)
- [Fenofibrato 200 mg – cápsula e 250 mg – cápsula de liberação retardada](#)
- [Genfibrozila 600 mg e 900 mg – comprimido](#)
- [Pravastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg – comprimido](#)

## CID's contemplados

E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8

## Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

### 1ª solicitação

#### PARA ÁCIDO NICOTÍNICO:

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
  - Diabetes melito;
  - Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
  - Evidência clínica de doença aterosclerótica.
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tiroestimulante); - realizado nos últimos 03 meses;

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE  
(Atualizado em 15/08/2023)

- Dosagem sérica – colesterol total- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos- realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

$$\text{Equação de Friedewald: LDL} = [(\text{Colesterol total}) - \text{HDL}] - (\text{Triglicerídeos}/5)$$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:  
o  $\beta$ -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.
- Descrever, no campo “Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?” do LME se paciente possui intolerância ou contraindicação ao tratamento com estatinas.

**PARA ATORVASTATINA E PRAVASTATINA:**

- Descrição, no campo “anamnese” do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
  - Diabetes melito;
  - Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
  - Evidência clínica de doença aterosclerótica
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tiroestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – colesterol total) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo LDL pela equação de Friedewald- realizado nos últimos 3 meses;

$$\text{Equação de Friedewald: LDL} = [(\text{Colesterol total}) - \text{HDL}] - (\text{Triglicerídeos}/5)$$

- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:  
o  $\beta$ -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

**PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:**

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética) realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) - realizado nos últimos 03 meses;

DISLIPIDEMIA PARA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE  
(Atualizado em 15/08/2023)

- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tiroestimulante) - realizado nos últimos 03 meses;
- Dosagem sérica – triglicerídeos - realizado nos últimos 03 meses;
- Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:  
o  $\beta$ -HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização.

### Renovação da Continuidade

#### **PARA ATORVASTATINA, PRAVASTATINA E ACIDO NICOTINICO:**

##### **Semestralmente ou a cada alteração de dose:**

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

#### **PARA BEZAFIBRATO, CIPROFIBRATO, FENOFIBRATO E GENFIBROZILA:**

##### **Semestralmente ou a cada alteração de dose:**

- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética)
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase).

##### **Semestralmente para os casos de hipertrigliceridemia:**

- Dosagem sérica – triglicerídeos.