

SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR

Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 23, de 04 de novembro de 2022 ([Protocolo na íntegra](#) e [Protocolo Resumido](#))

Medicamentos

- **Ciclofosfamida: comprimidos de 50 mg** (CID's D60, D60.1 e D60.8);
- **Ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg e solução oral de 100 mg/mL** (CID's D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, Z94.8);
- **Eltrombopague olamina: comprimidos de 25 e 50 mg** (CID's D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8);
- **Filgrastim: solução injetável de 300 mcg** (CID's D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8);
- **Imunoglobulina antitímócitos humanos (coelho): pó para solução injetável de 25 mg** (D60.0, D60.1, D60.8);
- **Imunoglobulina humana: pó para solução injetável ou solução injetável contendo 0,5; 1,0; 2,5 e 5,0 g** (D60.0, D60.1, D60.8).

CID's contemplados

D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8

Observação: A Síndrome de Falência Medular (SFM) é um grupo de doenças causadas por dano à Célula-Tronco e Progenitora Hematopoética. As condições clínicas mais frequentes de falências medulares são:

- Anemia Aplástica (AA)
- Aplasia Pura de Série Vermelha (APSV)
- Neutropenia Congênita Grave

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- [Relatório médico preenchido por hematologista, indicando a avaliação laboratorial e clínica da Síndrome de Falência Medular;](#)
- Hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos (realizado nos últimos 3 meses);
- Biópsia da medula óssea;
- Dosagem sérica - ácido fólico (realizado nos últimos 3 meses);

SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR (Atualizado em 08/07/2025)

- Dosagem sérica - vitamina B12 (realizado nos últimos 3 meses).

Adicionalmente, para os casos de APSV (Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha):

- Laudo/relatório médico da tomografia computadorizada de tórax para exclusão de timoma;
- Sorologia para parvovírus B19;
- Sorologias para HIV, hepatite B, hepatite C, EBV e CMV, para identificação de possíveis causas virais;
- Pesquisa de FAN (fator antinuclear) e fator reumatoide;

Para Portadores de Parvovírus B19:

- Pesquisa de anticorpos anti-B19 IgM no soro ou detecção do DNA viral no soro por técnicas de biologia molecular.

Adicionalmente, para os casos de AA (Anemia Aplástica):

- Pesquisa de células GPI (glicofosfatidilinositol);
- Teste de diepoxibutano (DEB teste);

Renovação da Continuidade**Para todos:**

- Hemograma com Plaquetas (realizado nos últimos 3 meses);
- Contagem de Reticulócitos (realizado nos últimos 3 meses);
- TGO/AST e TGP/ALT (realizado nos últimos 3 meses);
- Creatinina (realizado nos últimos 3 meses).

Adicionalmente, para Ciclosporina:

- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – magnésio;
- Dosagem sérica – ciclosporina.

Adicionalmente, para Eltrombopague olamina:

- Dosagem sérica – gama glutamil transferase (Gama-GT);
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica – bilirrubinas.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).