

SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR

Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 23, de 04 de novembro de 2022 ([Protocolo na Íntegra](#) e [Protocolo Resumido](#))

Medicamentos

- [Ciclofosfamida: comprimidos de 50 mg](#)
- [Ciclosporina: 10mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL](#)
- [Eltrombopague olamina: comprimidos de 25 e 50 mg](#)
- [Filgrastim: solução injetável de 300 mcg](#)
- [Imunoglobulina humana: pó para solução injetável ou solução injetável contendo 0,5;1,0;2,5 e 5,0g.](#)

CID's contemplados

D60.0, D60.1, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, Z94.8

Observação: A Síndrome de Falência Medular (SFM) é um grupo de doenças causadas por dano à Célula-Tronco e Progenitora Hematopoética. As condições clínicas mais frequentes de falências medulares são:

- Anemia Aplástica (AA)
- Aplasia Pura de Série Vermelha (APSV)
- Neutropenia Congênita Grave

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- [Relatório médico preenchido por hematologista, indicando a avaliação laboratorial e clínica da Síndrome de Falência Medular;](#)
- Hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos (realizado nos últimos 3 meses);
- Biópsia da medula óssea;
- Dosagem sérica - ácido fólico (realizado nos últimos 3 meses);

SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR (Atualizado em 16/10/2025)

- Dosagem sérica - vitamina B12 (realizado nos últimos 3 meses).

Adicionalmente, para os casos de APSV (Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha):

- Laudo/relatório médico da tomografia computadorizada de tórax para exclusão de timoma;
- Sorologia para parvovírus B19;
- Sorologias para HIV, hepatite B, hepatite C, EBV e CMV, para identificação de possíveis causas virais;
- Pesquisa de FAN (fator antinuclear) e fator reumatoide;

Para Portadores de Parvovírus B19:

- Pesquisa de anticorpos anti-B19 IgM no soro ou detecção do DNA viral no soro por técnicas de biologia molecular.

Adicionalmente, para os casos de AA (Anemia Aplástica):

- Pesquisa de células GPI (glicofosfatidilinositol);
- Teste de diepoxibutano (DEB teste);

Renovação da Continuidade**Para todos:**

- Hemograma com Plaquetas (realizado nos últimos 3 meses);
- Contagem de Reticulócitos (realizado nos últimos 3 meses);
- TGO/AST e TGP/ALT (realizado nos últimos 3 meses);
- Creatinina (realizado nos últimos 3 meses).

Adicionalmente, para Ciclosporina:

- Dosagem sérica – potássio;
- Dosagem sérica – magnésio;
- Dosagem sérica – ciclosporina.

Adicionalmente, para Eltrombopague olamina:

- Dosagem sérica – gama glutamil transferase (Gama-GT);
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica – bilirrubinas.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).