

## SULFATO DE AMICACINA

### Tuberculose (Esquema Especial)

[Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil – 2ª edição](#)

#### Informações gerais

**CID-10:** A15 a A19

#### Esquema terapêutico recomendado:

- A Amicacina, medicamento injetável, deverá ser utilizada em regime intermitente (duas a três vezes por semana), desde o início do tratamento, por 8 meses;
- Dose máxima: 1000 mg/dia ou 750 mg/dia para pacientes acima de 59 anos.

O tratamento da **Tuberculose** segue esquema terapêutico com a associação a outros medicamentos, levando-se em consideração o comportamento metabólico e localização do bacilo; nestes casos poderão ocorrer esquemas especiais e individualizados para casos com resistência extensiva, por indicação de profissionais com experiência no manejo de casos resistentes, e em centros de referência.

Destaca-se a importância do acompanhamento clínico de pacientes com TB multidrogarresistente em centros de referência, em parceria com as Unidades Básicas de Saúde, para garantir a integralidade do cuidado e a adesão ao tratamento, promovendo o Tratamento Diário Observado (TDO).

**Responsável pelo financiamento:** Ministério da Saúde

#### Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 25°C), protegido da luz e umidade.

#### Solicitação do Medicamento

**Atenção:** O medicamento para composição de esquema especial de Tuberculose é fornecido diretamente pelo Ministério da Saúde às referências secundárias e terciárias, mediante solicitação no SITE-TB.